



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante
Ciudad Sanitaria Dr. Luís E. Aybar
RNC 4-3006 345-2

“Año de LA Innovación y la Competitividad”



Ficha Técnica

Bumetanida 0.5mg de 2ml caja de 5 ampolletas

Forma farmacéutica y formulación: Cada comprimido contiene: bumetanida 1 mg. Excipiente cbp 1 comprimido. Cada ampolleta contiene: bumetanida 0.5 mg. Vehículo cbp 2 ml.

Indicaciones terapéuticas: Bumetanida está indicado en el tratamiento de la hipertensión, edema de la insuficiencia cardíaca congestiva, edema de la cirrosis descompensada, edema renal, toxemia del embarazo y retención hídrica en la tensión premenstrual y como coadyuvante en el tratamiento de la mastopatía fibroquística.

Farmacocinética y farmacodinamia: La bumetanida es un potente diurético de asa, el cual produce una marcada diuresis relacionada a la dosis y una secreción urinaria de sodio y cloro en un rango de dosis de 0.5 a 3 mg. Sobre base de peso bumetanida es 40 veces más potente que la furosemida aunque las curvas dosis-respuesta para los dos fármacos no son paralelas fuera de éste rango de dosis, y en casos como falla renal, en donde altas dosis pueden ser usadas, la relación 40:1 puede perderse.

Presentación: caja con 5 ampolletas de 2 ml, conteniendo 0.5 mg. Caja azul claro y blanco.

Almacenamiento: Conservar en lugar fresco y seco.